

Los cuidados que cambian tu día a día

DUCRAY

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

2017 INNOVACIÓN DEXYANE MeD

EL 1^{ER} PRODUCTO SANITARIO*
PARA TRATAR EL ECZEMA ATÓPICO, DE
CONTACTO Y CRÓNICO DE LAS MANOS



A close-up, soft-focus photograph of a woman's skin. She is shown from the side, applying a cream or lotion to her upper arm. The lighting is warm and natural, highlighting the texture of her skin. The background is blurred, showing more of her body and the cream being applied.

ECZEMA

ENFERMEDAD DE PIEL QUE AFECTA DEL

10-20%
DE LA POBLACIÓN

EN ESPAÑA⁽¹⁾

DETRÁS DE ESTA CIFRA SE ESCONDEN TANTAS HISTORIAS... ¿HOMBRES, MUJERES O NIÑOS? TODO EL MUNDO PUEDE ESTAR AFECTADO POR EL ECZEMA

La prevalencia del eczema atópico se ha triplicado en 30 años en los países industrializados. Hoy en día, afecta hasta al **25% de los niños menores de 7 años** y se sitúa todavía alrededor de un **18% en los niños de 7 a 16 años**⁽²⁾.

"Por la noche me despierto mucho, después ya consigo dormirme. Me levanto, espero que pase el tiempo. En la escuela, me dicen: "¿Por qué tienes una piel de persona anciana?". Les digo que simplemente es eczema."

Lucas, 11 años

El eczema crónico de las manos afecta del 4% al 10% de la población adulta mundial⁽³⁾.

"Tengo un eczema casi diario. Lo que más me molesta es la mirada de los demás. Soy comercial, tengo un trabajo donde me encuentro con muchas personas. A veces estas personas miran mis manos con insistencia, es un poco molesto."

Julia, 38 años

Los eczemas de contacto afectan al 27% de la población europea, con una prevalencia superior en las mujeres⁽⁴⁾.

"En el tratamiento termal, me han comentado que la palabra "eczema" significaba "burbujeo" en griego, lo que representa exactamente la idea que tengo. Como el eczema se sitúa en la piel y ésta es nuestra barrera respecto al exterior, vamos a ser sensibles a todo lo que nos rodea. Yo soy alérgica a los botones de los pantalones que son de níquel."

Carolina, 29 años

1.- Nota de prensa www.aedv.es 25 de Marzo de 2015 "La contaminación triplica los eczemas". Dra Ana Rodrigues, dermatóloga, miembro de la AEDV, Academia Española de Dermatología y Venerología

2.- Eichenfield L.F. et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2014 February ; 70(2): 338-351.

3.- Thyssen J.P. et al. The epidemiology of hand eczema in the general population – prevalence and main findings. Contact Dermatitis 2010; 62: 75–87.

4.- Diepgen T.L. et al. Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions. British Journal of Dermatology. 2016; 174: 319-329

INNOVACIÓN 2017 DUCRAY

Marca comprometida desde hace 86 años, estimulada por su cultura farmacéutica, DUCRAY va siempre más allá en sus investigaciones con un único objetivo: cambiar la vida diaria de los pacientes para que puedan recuperar su bienestar y confianza. Una promesa fundada en la escucha activa de las necesidades de los pacientes y una promesa mantenida gracias a los expertos: la razón de ser de los Laboratorios Dermatológicos DUCRAY.

**CON ELLOS NACE LA INNOVACIÓN EN DERMATOLOGÍA,
LA PRECISIÓN CIENTÍFICA FIRMADA DUCRAY**

A close-up photograph of a man's torso and hands. He is wearing a blue polo shirt with three buttons at the collar. His hands are clasped together in front of him, and the skin on his fingers and palms shows signs of eczema, including redness, dryness, and some white scaly patches. The background is plain white.

PALABRAS DE LOS EXPERTOS:
EL ECZEMA



DRA. CHRISTELLE DURIEU
DERMATÓLOGA-CONSULTORA
PARA LOS LABORATORIOS
DERMATOLÓGICOS DUCRAY

“ EL PICOR Y EL DOLOR PRODUCIDOS PUEDEN SER EL ORIGEN DE TRASTORNOS DEL SUEÑO Y REPERCUTIR EN LA CALIDAD DE VIDA ”

El eczema es una enfermedad de la piel frecuente que puede afectar a los bebés, a los niños y a los adultos. Se manifiesta a través de la aparición de lesiones inflamatorias caracterizadas por:

- > **Rojeces** (eritema)
- > **Vesículas** que pueden exudar y recubrirse luego de costras
- > **Hinchazón** (edema)
- > **Descamación** (escamas)
- > **Picor intenso** (prurito) que pueden provocar lesiones de rascado

Estas lesiones vienen acompañadas de una sequedad de la piel (xerosis). La función barrera cutánea está alterada, lo que provoca una pérdida de agua. Además, la penetración de los alérgenos está favorecida, provocando una estimulación del sistema inmunitario y una inflamación.

Los eczemas crónicos se caracterizan con una sucesión de “fase de brotes” y de “fase de remisión”⁽⁵⁾.

TIPOS DE ECZEMAS MÁS FRECUENTES

ECZEMA ATÓPICO O DERMATITIS ATÓPICA:

Patología cutánea más frecuente en los niños: Se manifiesta más a menudo en las personas con una predisposición genética: se habla de terreno atópico.

El eczema atópico puede afectar a todas las zonas del cuerpo, pero predomina a nivel de la cara y de los pliegues (huecos de los codos y huecos poplíteos), a menudo de manera simétrica. El picor y el dolor provocados pueden ser el origen de los trastornos del sueño ⁽⁶⁾ y repercutir en la calidad de vida del niño y de su familia.

ECZEMA DE CONTACTO:

También muy frecuente, **es de origen alérgico**. Se desarrolla primero en la parte del cuerpo en contacto directo con el alérgeno pero puede extenderse. Los alérgenos más frecuentes son el níquel, perfume, conservantes de productos cosméticos... Puede ser agudo o crónico. Se distingue de la dermatitis irritativa o cáustica (contacto de la piel con productos de limpieza del hogar, con detergentes, con productos químicos...)⁽⁷⁾.

CASO PARTICULAR DEL ECZEMA CRÓNICO DE LAS MANOS:

Su origen puede ser múltiple: **atópico, alérgico y/o irritativo, se considera como una de las patologías profesionales más frecuentes**. Las profesiones más afectadas son las de la metalurgia, la peluquería, la construcción y el sector agro-alimentario. La piel es rugosa, irritada, muy seca, incluso a veces fisurada y con dolor⁽⁸⁾.

IMPACTO PSICOLÓGICO IMPORTANTE

Es importante apuntar el impacto psicológico que el eczema puede provocar en los pacientes y su entorno. En efecto, trabajos epidemiológicos de calidad de vida han mostrado que **los eczemas pueden provocar un sentimiento de vergüenza y de pérdida de la autoestima**. Pueden también asociarse a estados ansiosos o depresivos.



(6) Ring et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis); Part 1. JEADV. 2012; 26: 1045-60

(7) Diepgen TL et al. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema. J Dtsch Dermatol Ges. 2015; 13: e1-22.

(8) J. Brasch et al. Guideline contact dermatitis. Allergo J Int. 2014; 23 126-38

UN TRATAMIENTO DERMATOLÓGICO ES NECESARIO

UN BUEN TRATAMIENTO DEL ECZEMA IMPLICA UNA ESTRATEGIA GLOBAL A LARGO PLAZO: INFORMACIÓN, EVITAR FACTORES DESENCANDENANTES, CUIDADO DE LA PIEL Y TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO^{(9) (10) (11)}

LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA ES PRIMORDIAL PARA QUE EL PACIENTE SEA ACTOR EN SU ENFERMEDAD Y RESPONSABILIZARLE.

DERMOCORTICOIDES: EL TRATAMIENTO DE REFERENCIA

Aplicados en las lesiones en fase de brotes, los dermocorticoides **calman la inflamación, alivian el picor y el dolor**. Permiten también espaciar los brotes. No obstante, hoy en día, existe un verdadero problema de cumplimiento terapéutico, porque la corticofobia afectaría a cerca de 3 de cada 4 pacientes⁽¹²⁾.

LOS EMOLIENTES EN COMPLEMENTO

Las zonas secas, fuera lesiones, son tratadas con emolientes. El objetivo es **restaurar la barrera cutánea previniendo a su vez los brotes**. La aplicación de emolientes es un gesto clave del tratamiento. Aportan confort, hidratan, limitan la sensación de tirantez y el prurito. Participando al efecto barrera, limitan la penetración de los agentes externos (bacterias, virus, alérgenos). Se recomienda aplicarlos a diario.

Además, es indispensable un producto de higiene emoliente adaptado con el fin de garantizar una higiene no agresiva y no irritante.

Finalmente, se pueden recomendar otras medidas complementarias:

ropa confortable de algodón, limitar el contacto con los alérgenos del medioambiente (ácaros, pelos de animales), airear las habitaciones...

(9) J-H. Saurat et al. Dermatologie et infections sexuellement transmissibles. 5ème édition. Masson. p 45

(10) S. Weidinger, N. Novak. Atopic dermatitis. 2015

(11) A. Nosbaum et al. Dermate de contact allergique et irritative. Physiopathologie et diagnostic immunologique. Maladies Professionnelles et de l'Environnement 2010; 71:394-397.

(12) Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis, H. Aubert-Wastiaux et al. BJD 2011 166, pp808-814



CARINE MEJEAN
ESTRATEGIA Y DESARROLLO
LABORATORIOS
DERMATOLÓGICOS DUCRAY

“ DEXYANE MeD ES EL ÚNICO PRODUCTO SANITARIO* EN TRATAR, REPARAR Y LIMITAR LA REPARICIÓN DE LAS LESIONES DE LOS 3 TIPOS DE ECZEMAS ”

“ El eczema es uno de las principales dermatosis mundiales que impacta profundamente en la vida diaria de los pacientes, particularmente en su autoestima.

Porque los Laboratorios Dermatológicos Ducray acompañan desde 1930 el tratamiento de los desórdenes dermatológicos cutáneos, siempre más cerca de las necesidades de los pacientes, hemos desarrollado la gama Dexyane.

Detrás de una verdadera gestión de innovación útil, la gama Dexyane se inscribe perfectamente en nuestra misión de marca: la de ofrecer un tratamiento y cuidados que cambian la vida diaria de los pacientes con el fin de ayudarlos a disfrutar de la vida plenamente”.

FRUTO DE 6 AÑOS DE INVESTIGACIÓN DEXYANE MeD ES EL PRODUCTO SANITARIO:

> que trata los 3 tipos de eczema:

- atópico
- de contacto
- crónico de las manos

> que combina 3 acciones complementarias:

- trata, repara y limita la reparación de las lesiones de eczemas

> para 3 utilizaciones:

- sólo sobre las lesiones leves
- en asociación con los tratamientos dermocorticoides para una mejora más rápida
- en mantenimiento para limitar la reparación de las lesiones

2017 INNOVACIÓN DEXYANE **MeD**

MÁS QUE UN SIMPLE EMOLIENTE...

EL ÚNICO PRODUCTO SANITARIO PARA TRATAR
Y LIMITAR LA REPARACIÓN DE LAS LESIONES
DE ECZEMAS

- > **RESTAURA** la barrera cutánea alterada y corrige la sequedad
- > **ALIVIA** el picor y disminuye la intensidad de los signos de la inflamación (rojeces e irritaciones)
- > **PROTEGE** la piel formando un film semi-oclusivo de superficie
- > **LIMITA** la adhesión bacteriana (*S. aureus* potencialmente implicado en la sobreinfección de las lesiones)



El status de producto sanitario confiere a Dexyane MeD:

- > indicaciones claras y precisas para el paciente: "TRATAMIENTO DE LOS ECZEMAS"
- > una eficacia y una tolerancia testadas clínicamente.

Dexyane MeD se aplica directamente sobre las lesiones.

0% CORTISONA
PARABENOS
PERFUME



A PARTIR DE 3 MESES

¿POR QUÉ LA FÓRMULA DE DEXYANE **MeD** ES ÚNICA?

La textura innovadora de Dexyane MeD en forma de crema gelificada, se transforma en un apósito ultra-hidratante, pensado para utilizar la cara y el cuerpo, a utilizar a partir de los tres meses hasta la edad adulta.

UN EFECTO "APÓSITO" ULTRA-HIDRATANTE

MALLA POLISACÁRIDA SEMI-OCCLUSIVA "ULTRA-HIDRATANTE"

1

Esta malla está diseñada a base de poliglucosa de origen natural. Proporciona su efecto "apósito" a Dexyane MeD:

- > **Favorece** la hidratación cutánea
- > **Asegurada** una protección mecánica respecto a los irritantes
- > **Limita** la adhesión bacteriana implicada en la sobreinfección de las lesiones

2

EFECTO REPARADOR DE LA FUNCIÓN BARRERA

Dexyane MeD está compuesto de una **fase hidra-nutritiva al 51%**, destinada a restaurar la barrera cutánea alterada y corregir la sequedad gracias a una asociación de glicerina (20%), manteca de karité, triglicéridos e hidroxydecine®.

3

EFECTO CALMANTE EN EL PICOR ENOXOLONA 0,7%

4

FÓRMULA NÍQUEL TESTADO⁽¹³⁾

Sin parabenos, sin perfume y sin cortisona

> 3 MESES



EXCELENTE TOLERANCIA en el
97% % DE LAS PERSONAS N=61
después de 3 semanas de utilización⁽¹³⁾

Metodología: Estudio de tolerancia tópica, en abierto, no comparativo en 61 personas que presentan un eczema atópico leve a moderado: 19 bebés (de 3 a 23 meses), 22 niños (de 2 a 6 años), 20 adultos (de 18 a 65 años), aplicación de Dexyane MeD 2 veces/día durante 3 semanas en las lesiones de eczema.

Criterio principal: Tolerancia de Dexyane MeD a 3 semanas, evaluada con una escala de 1 a 5 (excelente a mediocre) tomando en cuenta los signos funcionales (autoevaluación pacientes o padres) y físicos (evaluado por dermatólogos). Durante el estudio, 6 pacientes han aportado signos de malestar cutáneos moderados y reversibles.

(13) Open-label study to assess the tolerance and efficacy of the product RV4421ABS0042, applied in paediatric and adult populations with mild to moderate Atopic Dermatitis for three weeks. WPD-DOC-26 V1 , 22/02/2016, 64-65.



DEXYANE MeD

ALIVIAR MÁS RÁPIDAMENTE A LOS PACIENTES⁽¹⁴⁾

EFICACIA Y TOLERANCIA TESTADAS CLÍNICAMENTE

El conjunto de los 3 estudios clínicos realizados por los Laboratorios Dermatológicos DUCRAY en el marco de la evaluación de Dexyane MeD, han sido realizados sobre un total de 155 pacientes (61+40+54) de 3 meses a 66 años. Han demostrado:

**UNA MEJORA MÁS RÁPIDA
SOBRE LAS LESIONES
MODERADAS A SEVERAS
DEL ECZEMA ATÓPICO ⁽¹⁴⁾**

**a partir de 3 días en asociación
con los dermocorticoides**

**EFICACIA UTILIZANDO
SÓLO EN EL ECZEMA
CRÓNICO DE MANOS LEVE A
MODERADO ⁽¹⁵⁾**

**- 73 % de dolor
a partir de 8 días**

**LIMITA LA REPARICIÓN DE
LAS LESIONES DEL ECZEMA
ATÓPICO ⁽¹⁴⁾**

**- 83 % de la tasa de recaídas
a los 15 días**

(14) An intra-individual randomized controlled study to evaluate the efficacy and tolerance of the product RV4421 ABS0042 in association with a moderately potent topical corticosteroid in adults with atopic dermatitis. RV4421A2013147 V1, 04/03/2016, 91-92, 182-183.

(15) One-label study to assess the tolerance and efficacy of the product RV4421A BS0042 applied for three weeks, in adults with mild to moderate hand dermatitis. RV4421A2013149, 29/02/2016 V1, 112-113.

DEXYANE MeD

TOLERANCIA BEBÉS, NIÑOS, ADULTOS⁽¹³⁾

Este estudio ha sido realizado para evaluar la tolerancia de la crema Dexyane MeD utilizada sola sobre las lesiones de eczemas de bebés (de más de 3 meses), de niños y de adultos que sufren eczema atópico (59 pacientes en total).

Resultados:


La tolerancia ha sido evaluada por los pacientes y los dermatólogos. Los resultados muestran una tolerancia excelente en el 97% de los pacientes (bebés, niños, adultos) después de 3 semanas de aplicación dos veces al día.

EFICACIA EN ASOCIACIÓN CON LOS DERMOCORTICOIDES, TRATAMIENTO DE REFERENCIA DEL ECZEMA⁽¹⁴⁾

Este estudio comparativo tenía como objetivo evaluar la eficacia de los tratamientos: Dexyane MeD en asociación con dermocorticoide comparativamente con el dermocorticoide solo sobre lesiones moderadas a severas de eczema, en 54 personas que presentan una dermatitis atópica.

Resultados:

A partir de 3 días, la aplicación dos veces al día de Dexyane MeD ha permitido disminuir significativamente (-25%) la severidad de los signos clínicos (escala de evaluación L-SCORAD) del eczema comparativamente con dermocorticoide utilizado solo (-14%).



▶ LA UTILIZACIÓN DE DEXYANE MED EN ASOCIACIÓN CON LOS DERMOCORTICOIDES PERMITE ALIVIAR A LOS PACIENTES MÁS RÁPIDAMENTE.

(14) An intra-individual randomized controlled study to evaluate the efficacy and tolerance of the product RV4421 ABS0042 in association with a moderately potent topical corticosteroid in adults with atopic dermatitis. RV4421A2013147 V1, 04/03/2016, 91-92, 182-183.

Una segunda fase de este estudio ha permitido demostrar que seguir con la aplicación de Dexyane MeD "en mantenimiento" cuando la lesión de eczema ha sido tratada con el dermatocorticoide, permite disminuir la tasa de recaídas (es decir, la reaparición de las lesiones de eczema):

Después de 15 días de aplicación en mantenimiento, con Dexyane MeD, el número de pacientes que presentan una reaparición de las lesiones (tasa de recaídas) disminuye de un 83% (1,9% versus 11,3%).

EFICACIA Y TOLERANCIA EN EL ECZEMA CRÓNICO DE LAS MANOS⁽¹⁵⁾


Asimismo, se ha realizado un estudio con el fin de evaluar la tolerancia y la eficacia de Dexyane MeD en 40 pacientes con eczema crónico de las manos, con lesiones leves a moderadas. Dexyane MeD se ha aplicado solo, 2 veces al día durante 3 semanas.

3

Resultados:

La evaluación de la tolerancia local global medida por los dermatólogos y por los pacientes a 3 semanas ha sido valorada de buena a excelente por el 100% de los pacientes.

La evaluación de la eficacia basada en la cotación mTLSS (Modified Total Lesion Symptom Score), escala visual para evaluar la severidad clínica, ha considerado los diversos parámetros como: eritema, prurito, dolor, hiperqueratosis, edema... así como el conjunto de los síntomas en su globalidad después de 8, 15 y 22 días de aplicación. La mayoría de los parámetros han mejorado. En particular, el score de dolor ha disminuido significativamente de 4,2 a 1,2, es decir, un 73% en 8 días.



► BUENA TOLERANCIA Y SIGNOS CLÍNICOS MEJORADOS DESPUÉS DE 3 SEMANAS DE APLICACIÓN.

(15) One-label study to assess the tolerance and efficacy of the product RV4421A BS0042 applied for three weeks, in adults with mild to moderate hand dermatitis. RV4421A2013149, 29/02/2016 V1, 112-113.

PRODUCTO SANITARIO DEXYANE MeD

PARA TRATAR Y LIMITAR
LA REPARACIÓN DE LAS LESIONES
DE LOS 3 TIPOS DE ECZEMA

Consejos de utilización: aplicar directamente sobre las lesiones inflamatorias de eczema de 1 a 2 veces al día. Cara y cuerpo. A partir de 3 meses.

Tubo de 30 ml
CN: 179605.9
PVP rec: 10 €*
*

Tubo de 100 ml
CN: 179607.3
PVP rec: 15,50 €*
*



CUIDADOS DERMOCOSMÉTICOS DEXYANE

DEXYANE

Crema y Bálsamo emolientes anti-rascado

PARA REFORZAR
LA BARRERA CUTÁNEA

Consejos de utilización: aplicar de 1 a 2 veces al día sobre las zonas secas hasta su completa absorción. Cara y cuerpo.

DEXYANE Crema

Tubo de 200 ml
CN: 179433.8
PVP rec: 19 €*

Frasco dosificador de 400 ml
CN: 179434.5
PVP rec: 24 €*

DEXYANE Bálsamo

Tubo de 200 ml
CN: 179430.7
PVP rec: 19 €*

Frasco dosificador de 400 ml
CN: 185967.9
PVP rec: 24 €*

DEXYANE

Gel limpiador sobregraso

EL GESTO DE SUAVIDAD
A DIARIO

Consejos de utilización: aplicar sobre la cara o el cuerpo previamente húmedos. Hacer espuma, aclarar y secar delicadamente.

Frasco dosificador de 400 ml

CN: 178317.2

PVP rec: 17,40 €*



DEXYANE

ECZEMAS MODERADOS A SEVEROS

EN ASOCIACIÓN

Dermocorticoide
durante 7 a 15 días



DEXYANE MeD



PRODUCTO SANITARIO

2 aplicaciones al día directamente
sobre las lesiones

ACELERAR LA EFICACIA DE LOS DERMOCORTICOIDES

TRATAMIENTO DE LOS BROTES
LESIONES INFLAMATORIAS

CUIDADO DE LAS ZONAS SECAS
FUERA LESIONES

DEXYANE
CREMA Y BÁLSAMO EMOLIENTES ANTI-RASCADO

DISMINUIR LA SEQUEDAD Y REFORZAR LA BARRERA CUTÁNEA

ECZEMAS LEVES

SOLO

DEXYANE MeD



PRODUCTO SANITARIO

2 aplicaciones al día directamente sobre las lesiones

TRATAR Y LIMITAR LA REPARACIÓN DE LAS LESIONES



CUIDADOS DERMO-COSMÉTICOS

HIGIENE

DEXYANE GEL LIMPIADOR SOBREGRASO



CUIDADO DERMO-COSMÉTICOS

LIMPIAR CON SUAVIDAD

Los cuidados que cambian tu día a día

DUCRAY

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

La gestión de la **INNOVACIÓN** en **DUCRAY** aúna la ética científica y la cultura farmacéutica.

La curiosidad, la observación y el espíritu crítico nutren la **INNOVACIÓN ÚTIL** de **DUCRAY**.

DUCRAY valora el **SEGUIMIENTO CIENTÍFICO** al lado de los **EXPERTOS INTERNACIONALES** en los segmentos de la marca: los capilares, los cuidados de la piel, la educación terapéutica, el conocimiento de las especialidades y necesidades de los diferentes fototipos.

DUCRAY busca el **BENEFICIO DEL PACIENTE** y valida sus orientaciones por sus expertos: médicos, marketing, R & D.

DUCRAY VALORIZA LA INNOVACIÓN gracias a trabajos clínicos, publicaciones e intervenciones durante Symposiums y Congresos Dermatológicos internacionales.

DUCRAY se pone al servicio de los profesionales de salud para **ACOMPañARLES A DIARIO**.

CONTACTO PRENSA

Manuel López

DirCom Laboratorios Dermatológicos Ducray

manuel.lopez@pierre-fabre.com

T. 915 230 159

www.ducray.es



www.facebook.com/DucrayEspana



www.youtube.com/DucrayEspana



www.pinterest.com/DucrayEspana

@ManuelDirCom



Pierre Fabre